



**КЛИНИКО-ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЗОГЕННОГО
НЕЙРОПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, НА
ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ**

Жураев Шохрух Жуманазарович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино.

Бухара, Узбекистан. e-mail: jorayev.shohruh@bsmi.uz

Аннотация. В статье показано, что нейropsychopathological изменения онкогинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста в мировом опыте показывают, что депрессия, тревога, посттравматический стресс-синдром и другие психические расстройства чаще встречаются у женщин с онкологическими заболеваниями. Степень и характер психических расстройств могут изменяться в зависимости от вида рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей больных. Во многих развитых странах психоонкология, занимающаяся психологическими, социальными и духовными аспектами рака, признана важной частью комплексного лечения рака. Неврологи и психиатры всего мира признают, что рак вызывает эмоциональное напряжение и депрессию, а естественное психopathological состояние является благоприятным условием для развития нейрокогнитивных нарушений.

Ключевые слова: репродуктивные, нейropsychopathological, рак, стресс, депрессия, нейрокогнитивные расстройства.

**CLINICAL AND PSYCHOSOMATIC FEATURES AND CHARACTERISTICS
OF THE NON-OSOGENEOUS NEUROPSYCHOPATHOLOGICAL STATE OF
WOMEN, FOR EXAMPLE, IN PATIENTS WITH CANCER OF THE
REPRODUCTIVE SYSTEM.**

Jo'rayev Shoxrux Jumanazarov

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino. Bukhara, Uzbekistan. e-

mail: jorayev.shohruh@bsmi.uz

Annotation. The article shows that neuropsychopathological changes in oncogynecological diseases in women of reproductive age in world experience show that depression, anxiety, post-traumatic stress syndrome, and other mental disorders are more common in women with oncological diseases. The degree and nature of mental disorders can vary depending on the type of cancer, the stage of the disease, and the individual characteristics of the patients. In many developed countries, psycho-oncology, which deals with the psychological, social, and spiritual aspects of cancer, is recognized as an



important part of comprehensive cancer treatment. Neurologists and psychiatrists worldwide acknowledge that cancer causes emotional tension and depression, and a natural psychopathological state is a favorable condition for the development of neurocognitive disorders.

Keywords: Reproductive, neuropsychopathological, oncological diseases stress, depression, neurocognitive disorders.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак ежегодно становится причиной смерти почти 459 000 человек в регионе Восточного Средиземноморья (2023). За последние пять лет в регионе зарегистрировано около 1,6 миллиона случаев рака. Ежегодно у почти 734 000 человек диагностируют рак, и прогнозируется, что к 2040 году заболеваемость увеличится примерно на 50%. У пациентов с онкологическими заболеваниями наблюдаются глубокие изменения не только в соматическом, но и в психологическом состоянии. Когда человек внезапно узнает, что у него рак, он впадает в аффективное состояние, испытывая депрессию или сильную тревогу. Наиболее серьезная проблема у этих пациентов заключается в том, что наряду с основным заболеванием психопатологическое состояние хронически сохраняется и прогрессирует. Психопатологическое состояние проявляется различными клиническими и психосоматическими симптомами. В 2018 году в мире было зарегистрировано 18,1 миллиона случаев рака, при этом показатели смертности достигли 9,6 миллиона. В 2023 году было зафиксировано примерно 20 миллионов новых случаев, и 10 миллионов человек ушли из жизни.

Неврологи и психиатры всего мира признают, что рак вызывает эмоциональный стресс, депрессию, и, естественно, психопатологическое состояние является готовым состоянием для развития нейрокогнитивных нарушений. По данным American Journal of Clinical Oncology, каждый третий больной, борющийся с раком, испытывает нейропсихопатологические расстройства, и большинство наблюдений проводилось у пациентов с раком молочной железы, раком головы и шеи (2020). Онкологические заболевания замедляют деятельность центральной нервной системы (ЦНС), вызывают астению (патологическую утомляемость), раздражительность, замкнутость, агрессию.

Согласно некоторым данным, среди пациентов с раком диагностические собеседования выявили до 13% депрессии, а методы клинической оценки - до 49%. Величина этой разницы зависит от нескольких факторов, включая лечение, тип рака, течение и время постановки диагноза. Распространенность депрессии составляет 3% у пациентов с раком легких и 31% у пациентов с раком пищеварительного тракта.

РТСК билан касалланган беморларда рухий бузилишлар муаммосини ўрганиш якунида ушбу гуруҳ беморларида учрайдиган психопатологик ҳолатларнинг хилма-хиллигини таъкидлаш лозим. Бу ҳолат онкология амалиётида анъанавий ажратиб кўрсатиладиган стресс келтириб чиқарувчи омиллар манзарасини мураккаблаштирувчи кўшимча соматоген шароитлар мавжудлиги билан изоҳланади.



Булар орасида "фалажланишга олиб келувчи" операциялар (мастектомия, гистеректомия, систеректомия ва бошқалар) ва ҳайз кўриш функцияси сақланиб қолган беморларда қўлланиладиган гормон терапияси натижасида юзага келадиган гормонал бузилишлар муҳим ўрин тутди. Примечательно также отсутствие общей таксономии психопатологических синдромов у этой категории онкологических больных. Кроме того, следует особо отметить недостаточную разработанность методов реабилитации больных РТСЗ, отсутствие единых рекомендаций по проведению психофармакотерапии и психотерапевтических вмешательств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001.
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. – 376 с.
3. Бухтояров О.В., Архангельский А.Е. Психогенный кофактор канцерогенеза. Возможности применения гипнотерапии. СПб.: Алетейа; 2008.
4. Куприянова И.Е., Семке В.Я. Качество жизни и психическое здоровье. Томск; 2004.
5. Смулевич А.Б. Депрессии в онкологической практике (клиника, типологическая дифференциация). Психические расстройства в общей медицине. 2013; (3): 4—8.
6. Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства // Руководство по психиатрии. – М.: Медицина, 1999. – Т. 2. – С. 466–489.